

鼻へ噴霧するタイプのインフルエンザワクチン フルミスト[®]点鼻液を接種される方・ 保護者の方へ

〔監修〕 川崎医科大学 小児科学 特任教授 中野 貴司 先生


○ フルミスト点鼻液はこんなワクチンです

- 日本初となる、鼻へ噴霧するタイプのインフルエンザワクチンです。
- 鼻へ噴霧するため、針を刺す必要がありません。
- 2～18歳の方が対象です。
- フルミスト点鼻液のワクチン接種は、1回分で完了です。
(左右それぞれの鼻へワクチンを噴霧すれば、終わりです)
- フルミスト点鼻液を接種された方は、積極的に吸入(鼻ですする)する必要はありません。
- ワクチン接種後に、鼻水、鼻づまり、せき、のどの痛み、頭痛などの副反応が現れることがあります。まれに、ショックやアナフィラキシーなどの重大な副反応が現れることもあります。いつもと違う体調変化や異常を認めた場合は、速やかに医師にご連絡ください。



○ いつ頃からワクチンを接種すればいいの？

- インフルエンザは、例年12月～3月頃に流行し、1月～2月にピークを迎えることが多いので、12月中旬までにインフルエンザワクチンの接種を終えておくことが望まれます。



第一三共株式会社

○ フルミスト点鼻液 接種後の注意



- フルミスト点鼻液の**接種後30分間**は、アナフィラキシーなどの急な副反応が起こることがあります。医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。
- 接種当日は、入浴しても差し支えありません。
- 接種当日は、いつもの生活をして構いませんが、激しい運動は避けましょう。
- フルミスト点鼻液の接種後1～2週間は、重度の免疫不全者との密接な接触は避けてください。



医療機関名

医療法人協仁会 クリニックこまつ

【予約方法】

下記の時間帯に予約センターへお電話ください。

受付時間帯 : 月～金 14:00～16:00

予約センター: 072-823-1521(代表)

小児科インフルエンザ予約の件とお伝えください。



第一三共株式会社